

Бравекто®
(таблетки жувальні)
листівка–вкладка

Опис

Круглі таблетки від світло- до темно-коричневого кольору з гладкою або шорохуватою поверхнею.

Склад

Бравекто випускають із вмістом відповідної кількості діючої речовини (флураланер) в одній таблетці для собак різної маси тіла.

Одна таблетка містить діючу речовину флураланер:

- 112,5 мг для собак масою тіла 2–4,5 кг;
- 250,0 мг для собак масою тіла 4,5–10 кг;
- 500,0 мг для собак масою тіла 10–20 кг;
- 1000,0 мг для собак масою тіла 20–40 кг;
- 1400,0 мг для собак масою тіла 40–56 кг.

Допоміжні речовини: ароматизатор свинячої печінки, сахароза, крохмаль кукурудзяний, натрію лаурилсульфат, динатрію ембонат моногідрат, магнію стеарат, аспартам, гліцерин, олія соєва, макрогол 3350.

Фармакологічні властивості

ATC vet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53BX05 – ектопаразитицидні препарати для системного застосування)

Діюча речовина препарату флураланер - сполука з акарицидними та інсектицидними властивостями, активна до кліщів (*Ixodes spp.*, *Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Demodex spp.*, *Sarcoptes spp.*, *Otodectes spp.*) і бліх (*Ctenocephalides spp.*). Флураланер пригнічує активність нервової системи членистоногих, виступаючи антагоністом у ліганд-залежних хлористих каналцях (рецепторах ГАВА і глутамату).

Флураланер не викликає розвитку у тварин резистентності, що можливе при застосуванні інших інсектоакарицидних сполук. Навіть при досить низьких концентраціях флураланер пригнічує функцію розмноження (яйцекладки) у бліх.

Після перорального введення флураланер швидко всмоктується, досягаючи максимальної концентрації у плазмі крові впродовж однієї доби. Прийом корму пришвидшує всмоктування. Флураланер розподіляється системно і досягає максимальної концентрації у жировій тканині і далі в печінці, нирках і м'язах. Пролонговане утримання, повільне виведення з плазми крові ($t_{1/2}=12$ діб) і відсутність активного метаболізму забезпечує підтримку ефективної концентрації флураланера у проміжку між введенням. Флураланер має кишкову дію на бліх і кліщів, викликаючи загибель бліх через 8 годин після їх прикріplення до організму господаря, кліщів - через 12 годин. Флураланер виводиться переважно у незміненій формі екскрементами (до 90% дози), виведення нирками незначне.

Застосування

Профілактика і лікування собак при ектопаразитарних інвазіях. Препарат забезпечує тривалий (до 12 тижнів) системний інсектицидний і акарицидний захист тварин при імагінальних і ювенальних стадіях розвитку кліщів (*Ixodes ricinus*, *I. hexagonus*, *I. scapularis*, *I. holocyclus*, *Dermacentor reticulatus*, *D. variabilis* та 8 тижнів – проти *Rhipicephalus sanguineus*) і бліх (*Ctenocephalides spp.*). Препарат забезпечує захист щодо передачі бабезіозу (*Babesia canis*) кліщами (*Dermacentor reticulatus*), вбиваючи кліщів до моменту передачі збудника бабезіозу собаці. Це було встановлено у період після 12 тижнів після лікування.

Бравекто® застосовують для лікування собак, хворих на демодекоз, спричинений кліщами *Demodex spp.*, а також отодектоз і саркоптоз, спричинених кліщами *Sarcoptes* і *Otodectes spp.* під наглядом лікаря ветеринарної медицини. Ефективність Бравекто® при цих інвазіях доведена численними клінічними дослідженнями.

Препарат викликає загибель бліх через 8 годин після їх попадання на тіло хазяїна, кліщів - через 12 годин. Препарат Бравекто® можна застосовувати у комплексній терапії блонінних алергічних дерматитів.

Дозування

Таблетки задають перорально під час або незадовго до/після годівлі. Доза флуураланера становить 25-56 мг на 1кг маси тіла:

| Маса тіла тварини, кг | Доза препарату, кількість таблеток на одну тварину | | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Бравекто® 112,5 мг | Бравекто® 250 мг | Бравекто® 500 мг | Бравекто® 1000 мг | Бравекто® 1400 мг |
| 2-4,5 | 1 | | | | |
| >4,5-10 | | 1 | | | |
| > 10-20 | | | 1 | | |
| > 20-40 | | | | 1 | |
| > 40-56 | | | | | 1 |

Перед введенням препарату необхідно точно визначити масу тіла тварини методом зважування.

Собакам, масою тіла більше 56 кг, необхідно вводити відповідну комбінацію двох таблеток. Завдяки вмісту в таблетках ароматизаторів таблетки добре поїдаються собаками. За необхідності таблетка може згодовуватися з кормом або її кладуть на корінь язика. Необхідно переконатись у проковтуванні таблетки твариною. Не допускається розламування або ділення таблеток.

Препарат Бравекто® забезпечує захист тварини від бліх і кліщів до 12 тижнів.

Протипоказання

Індивідуальна гіперчутливість тварин до діючої речовини (флуураланера)!

Не застосовувати препарат цуценятам до 8-тижневого віку і/або собакам масою тіла до 2 кг маси тіла!

Не застосовувати тваринам з інтервалом меншим, ніж 8 тижнів!

Застереження

Препарат можна застосовувати тваринам під час вагітності і лактації.

Іноді (до 1,6 % тварин) можливі короткоспільні симптоми побічної дії органів травлення (блівота, діарея, зниження апетиту і слинотеча).

Форма випуску

Відповідно для тварин різної маси тіла випускають таблетки із різним вмістом діючої речовини флуураланера:

- 112,5 мг для собак масою тіла 2-4,5 кг;
- 250,0 мг для собак масою тіла 4,5-10 кг;
- 500,0 мг для собак масою тіла 10-20 кг;
- 1000,0 мг для собак масою тіла 20-40 кг;
- 1400,0 мг для собак масою тіла 40-56 кг.

Препарат випускають у блістерах із алюмінієвої фольги по 1, 2 або 4 таблетки, які пакують у картонні коробки.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей, місце при температурі до 30°C.

Термін придатності

2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Інтервет Інтернешнл Б.В. (Королівство
Нідерландів)

Вім де Корверштраат, 35 5831 АН Боксmeer

Виробник готового продукту

Інтервет ГесмбХ (Австрія)

Сіменштрассе 107, 1210 Відень

Intervet International B.V. (The Netherlands)
Wim de Korverstraat, 35 5831 AN Boxmeer

Intervet GesmbH (Austria)

Siemesstrasse 107, 1210 Wien