

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Кілтікс[®] для собак.

2. Склад

Кожен грам нашійника містить діючі речовини (мг):

пропоксур - 1,00;

флуметрин - 0,225.

Допоміжні речовини: дибутил адипат, пропіленгліколь, октаноат деканоат, соєва олія, стеаринова кислота, двоокис титану (Е 171), оксид заліза, полівініл хлорид.

3. Фармацевтична форма

Поліхлорвініловий нашійник.

4. Фармакологічні властивості.

АТСvet QP53A, ектопаразитарні ветеринарні препарати для місцевого застосування

Діючі речовини нашійника виявляють синергічну дію на паразитоформні кліщі (*Rhipicephalus sanguineus* і *Ixodes ricinus*) та блохи (*Ctenocephalides canis/felis*) у собак.

Пропоксур – ектопаразитицид, діє на паразита як контактна отрута, викликаючи токсичну акумуляцію нейрогормону ацетилхоліну на холінергічних нервових закінченнях, внаслідок чого настає загибель ектопаразитів (блохи, кліщі).

Флуметрин – ектопаразитицид синтетичної групи піретроїдів, має високу акарицидну активність. Синтетичні піретроїди взаємодіють з натрієвими каналцями мембран нервових клітин, викликають загибель ектопаразитів внаслідок деполаризації нервових закінчень. Флуметрин має швидку дію на бліх, проявляє також репелентну дію щодо комах.

Фармакокінетика

Обидва активних компоненти постійно виділяються з нашійника.

Комбінація пропоксуру та флуметрину в значній мірі підсилює ефективність нашійника проти кліщів та бліх у порівнянні до їх окремого використання.

Дермальна резорбція обох активних компонентів не спостерігається в значних кількостях. Дермальне LD₅₀, було визначене >5000 мг/кг (кролі). Клінічні, гематологічні, біохімічні показники (включаючи холінестеразу), а також показники сечі, які були отримані при вивченні впливу дії нашійника на тварин також не відхилялись від норми.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Собаки.

5.2 Показання до застосування

Профілактика та лікування собак при ураженні ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalides canis/felis*), кліщами (*Ixodes ricinus* і *Rhipicephalus sanguineus*).

5.3 Протипоказання

Не застосовувати одночасно з нашійником інші інсектицидні препарати. Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам.

5.4 Побічна дія

При гіперчутливості до складників нашійника у тварин можлива побічна дія: подразнення шкіри, свербіж. При ознаках подразнення шкіри зняти нашійник і звернутися до лікаря ветеринарної медицини.

5.5 Особливості застереження при використанні

Нашійник призначений лише для зовнішнього застосування.

5.6 Застосування під час вагітності і лактації

Застережень не має. Складники нашійника не мають ембріотоксичної та тератогенної дії.

5.7. Взаємодія з іншими засобами або інші форми взаємодії.

Застережень не має

5.8. Дозування і способи введення тваринам різного віку.

Для великих порід собак - нашійник довжиною 66 см (45 г), для середніх порід собак - 48 см (30,2 г), для дрібних порід собак – 35 см (12,5 г).

Після відкриття упакування нашійник розгортають, видаляють тонкі пластикові перегородки на внутрішній стороні і вільно закріплюють навколо шиї собаки таким чином, щоб між шиєю та нашійником залишався проміжок у 2 пальці, потім заціпають пряжкою. Нашійник повинен бути вільним на шиї і не стримувати росту тварини. Підігнаний належним чином нашійник у закріпленому стані повинен вільно рухатися.

Постійне використання нашійника Кілтікс® для середніх та великих собак забезпечує захист тварини від ектопаразитів протягом 7 місяців, для маленьких собак – 6 місяців. Тривалість і рівень захисту залежить від довжини, густоти та стану шерсті тварини, також від ступеню ураження ектопаразитами. При зниженні ефективності дії нашійника його необхідно замінити на новий. Перед купанням тварин нашійник необхідно знімати. Значне зволоження шерсті і шкіри тварини (дощ, купання, плавання) знижують ефективність нашійника.

Примітка

Разом із обробкою тварин проти ектопаразитів необхідно періодично чистити, мити і обробляти відповідними засобами місця перебування тварин (кошки для тварин, підстилки, місця відпочинку тварин, предмети догляду за тваринами і т.п.).

5.9. Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Немає.

5.10 Спеціальні застереження

Немає.

5.11 Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин період виведення препарату не визначається.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Після контакту з нашійником необхідно ретельно вимити руки теплою водою з милом.

Не допускати контакту тварин, які мають нашійник Кілтікс® для собак, з маленькими дітьми.

Люди з гіперчутливістю до компонентів нашійника повинні уникати контакту з ним.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Немає.

6.2 Термін придатності

5 років. Після відкриття упакування нашійник треба одразу використовувати.

6.3. Особливі заходи зберігання.

Зберігати препарат у закритому упакуванні виробника в сухому недоступному для дітей та тварин місці окремо від харчових продуктів та кормів за температури від 5 до 25 °С.

6.4. Природа і склад контейнера первинного упакування.

Поліхлорвініловий нашійник у герметичному упакуванні упакований у картонну коробку.

Для великих порід собак – 66 см (45,0 г), середніх порід собак – 48 см (30,2 г), для дрібних порід собак – довжиною 35 см (12,5 г).

6.5. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом або його випадками.

Невикористаний препарат та тара повинні бути знешкоджені відповідно до національних вимог. Діюча речовина нашійника токсична для риби та інших водних організмів, тому потрібно запобігати попаданню залишків нашійника у водойми. Нашійник є токсичним також для бджіл.

7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ, D-51368

Bayer Animal Health GmbH, D-51368

Лeverкузен, Німеччина

Leverkusen, Germany

8. Назва та місцезнаходження виробника (виробників)

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,

KVP Pharma + Veterinar-Product, GmbH,

Проєнсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль

Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel

Німеччина

Germany

9. Додаткова інформація